

# RECOMMANDATIONS EN MATIERE D'ECRASUREMENT DES COMPRIMES ET D'OUVERTURE DES GELULES POUR LES SPECIALITES INSCRITES AU LIVRET THERAPEUTIQUE

Indice de Révision : 0

DOCUMENT INTERNE - OPC




## Rédaction

Nom	Profil	Le	Visa
Mélanie BOISSEAU	Pharmacien RSMQPCM	24/01/2014	

## Approbation

Nom	Profil	Le	Visa
Christelle QUILICHINI	Responsable Qualité	24/01/2014	

## Validation

Nom	Profil	Le	Visa
Mélanie BOISSEAU	Pharmacien RSMQPCM	24.01.2014	
Dr Marc Noujaim	Médecin coordinateur Président de la CME	24.01.2014	
Valérie Geray	RRH et des soins	27/1/2014	

## Historique

Date	Indice de révision	Objet
24/01/2014	0	Création et intégration dans Blue medi

## Objet

↳ Etablir un guide pour l'administration des médicaments par sonde entérale ou lors des problèmes de déglutition

## Domaine d'application

↳ Le personnel de l'HAD Saint Sauveur

## Méthode d'évaluation

## Bibliographie

📄 \* Liste régionale des médicaments per os concernant l'écrasement des comprimés et l'ouverture des gélules (Omedit Haute-Normandie)

\* Administration par sonde entérale ou lors de problèmes de déglutition : recommandations au CHS de la Sarthe en matière d'écrasement des comprimés et d'ouverture des gélules. Dr Vailland Valérie.



Comprimés écrasables



Gélules ouvrables













Comprimés non écrasables




Gélules non ouvrables

















Comprimés dispersibles






Spécialités	Formes galéniques	Recommandations	Remarque, explication	Alternative
<b>Actiskenan 5mg, 10mg, 20mg et 30mg</b>	Gélule		Ne pas écraser les granules. Mélanger avec aliment semi solide (compote)	-
<b>Actonel 35mg</b>	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Ne pas administrer le comprimé écrasé sans sonde car risque d'œsophagite. A administrer à distance des repas. Ne pas s'allonger dans les 30 min suivant la prise.	Protelos 2g, granulés pour susp buv en sachet
<b>Adancor 10mg</b>	Comprimé sécable		Ne pas dissoudre dans l'eau	-
<b>Aérius 5mg</b>	Comprimé pelliculé		Avaler le comprimé avec de l'eau au moment ou en dehors des repas.	Aérius 0.5mg/ml, sirop, fl. de 150ml
<b>Aldactone 25, 50 et 75 mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		Goût très désagréable. Mettre en suspension dans un liquide.	-
<b>Allopurinol 100mg, 200, 300 mg</b>	Comprimé		Administrer avec boisson ou aliment	-
<b>Alpress LP 5mg</b>	Comprimé LP osmotique		-	Autre alpha 1 bloquant: Eupressyl 30mg ou 60mg
<b>Altéis 20 et 40mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Autres sartans: Atacand, Aprovel
<b>Amarel 2mg</b>	Comprimé		-	-
<b>Amlor 5 et 10mg</b>	Gélule		Ne pas écraser le contenu	-
<b>Amox-ac clavulanique 500mg /62,5mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Augmentin 500/62,5mg, susp buv, sachet

<b>Anafranil 10 et 25mg</b>	Comprimé enrobé		Si pas d'autre alternative	-
<b>Anafranil 75mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		-	Anafranil 10 ou 25 mg
<b>Androcur 100mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Aprovel 75, 150 et 300mg</b>	Comprimé pelliculé		-	-
<b>Aricept 5mg et 10mg</b>	Comprimé orodispersible		A placer sur la langue avec ou sans eau	-
<b>Aromasine 25mg</b>	Comprimé enrobé		-	-
<b>Atacand 4 et 8mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Atarax 25mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		-	goût amer, utilisation préférable de la solution buvable, alternative : Lexomil, Xanax
<b>Athymil 10 et 30mg</b>	Comprimé pelliculé (sécable pour le 60 mg)		-	Laroxyl gouttes
<b>Avlocardyl 40mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Avlocardyl LP 160mg</b>	Gélule		Ne pas écraser le contenu (microgranules gastroresistantes)	-
<b>Azantac 150 et 300mg</b>	Comprimé pelliculé		Principe actif photosensible. Administration immédiate	Utiliser l'injectable en buvable ou les comprimés effervescents
<b>Baclofène</b>	comprimé		-	-
<b>Bactrim 400mg/80mg et Bactrim forte 800mg/160mg</b>	Comprimé (sécable pour le 400mg/80mg)		-	Bactrim 100 ml suspension buvable



<b>Bipreterax</b>	Comprimé pelliculé		Administer en suspension après broyage	
<b>Bi-tildiem LP 90 et 120mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium
<b>Bricanyl LP 5mg</b>	Comprimé à libération prolongée		-	Autre beta-stimulant : Oxeol 10mg et 20mg - Ventoline buvable - Salbumol suppo
<b>Burinex 5mg</b>	Comprimé sécable		Principe actif photosensible. Administration immédiate	-
<b>Buspar 10mg</b>	Comprimé sécable		Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse	-
<b>Captopril 50mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Cardensiel (tout dosage)</b>	Comprimé pelliculé		-	Autres bêta-bloquants sans ASI : Tenormine, Detensiel, Seloken
<b>Casodex 50mg</b>	Comprimé enrobé		Adm. extemporanée après mise en suspension car risque de formation de cristaux.	-
<b>Celiprolol 200mg</b>	Comprimé enrobé sécable		Administration uniquement par sonde naso-gastrique	SECTRAL 40mg/ml 125 ml solution buvable *
<b>Cellcept 500mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Cellcept 1g/5ml poudre pour suspension buvable
<b>Ceris 20mg</b>	Comprimé enrobé		Très amer	-
<b>Chibro-proscar 5mg</b>	Comprimé pelliculé		Pas de manipulation par la femme enceinte	-
<b>Ciflox 250 et 500mg</b>	Comprimé pelliculé		-	-
<b>Clamoxyl 500mg</b>	Gélule		-	Clamoxyl 500mg/5ml, poudre pour susp buv

<b>Clamoxyl 1g</b>	Comprimé dispersible		Disperser dans un verre d'eau avant la prise. Administrer avant, pendant ou après le repas.	Clamoxyl 1g, susp buv en sachet
<b>Coaprovel 150 et 300 mg</b>	Comprimé pelliculé		-	-
<b>Cordarone 200mg</b>	Comprimé sécable		-	
<b>Cortancyl 1, 5 et 20mg</b>	Comprimé (sécable pour le 20mg)		Principe actif photosensible. Administration immédiate	Solupred orodispersible
<b>Coumadine 2 et 5 mg</b>	Comprimé sécable		Possible mais marge thérapeutique étroite. Administrer immédiatement	-
<b>Cozaar 50 et 100mg</b>	Comprimé pelliculé (sécable pour le 50mg)		-	Autre Sartans: Aprovel, Atacand
<b>Créon 12000 U et 25000 U</b>	Gélule de microgranules gastrorésistantes		Ne pas écraser le contenu.	-
<b>Cymbalta 60mg</b>	Gélule gastrorésistante		-	-
<b>Dafalgan 1g</b>	Comprimé pelliculé		Pas d'étude - préférer une autre forme galénique	Dafalgan 500mg ou 1g comprimé effervescent; Doliprane suppositoire
<b>Dafalgan 500mg</b>	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Dafalgan 500mg, comprimé effervescent; Doliprane suppositoire
<b>Dafalgan codéine 500mg/30mg</b>	Comprimé pelliculé		PA très amer	Dafalgan codéiné cp effervescent
<b>Dantrium 25 et 100mg</b>	Gélule		Ne pas mélanger avec de l'eau	-
<b>Debridat 100 et 200 mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Débridat 4,8mg/ml, susp buv, fl. de 125ml ou sachet 74,4 mg
<b>Delursan 250mg</b>	Comprimé pelliculé		PA très amer. Mélanger avec une compote	-

<b>Depakine 500</b>	Comprimé gastro-résistant		-	Forme buvable
<b>Depamide 300mg</b>	Comprimé gastro-résistant		-	-
<b>Déroxat 20mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		-	Deroxat 2mg/ml, susp buv, fl. de 150ml
<b>Dicodin LP 60mg</b>	Comprimé à libération prolongée		-	-
<b>Diffu-K 600mg</b>	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Potassium Richard en sirop 3% ou en sachets
<b>Digoxine 0,25mg</b>	Comprimé sécable		-	Digoxine 50µg/ml, sol buv, fl. de 60ml
<b>Ditropan 5mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Ebixa 10mg</b>	Comprimé pelliculé		PA très amer	Ebixa 0,5mg/goutte, sol buv en gouttes, fl. de 50ml
<b>Effexor 50mg</b>	Comprimé		Dissoudre le comprimé écrasé dans de l'eau puis bien rincer la sonde	-
<b>Effexor LP 37,5 et 75 mg</b>	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu	-
<b>Elisor 10, 20 et 40mg</b>	Comprimé sécable		Administration immédiate	-
<b>Emend 80 et 125mg</b>	Gélule			
<b>Esidrex 25mg</b>	Comprimé sécable		Gout désagréable, administration extemporanée	-
<b>Exacyl 500 mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Proposer exacyl ampoule
<b>Flagyl 500mg</b>	Comprimé pelliculé		Gout désagréable, utiliser la forme buvable	Flagyl 125mg/5ml, susp buv, fl. de 120ml














<b>Flecaïne 100mg</b>	Comprimé sécable		Non renseigné	-
<b>Flécaïne LP 50mg</b>	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu	-
<b>Fludex LP 1,5mg</b>	Comprimé pelliculé à libération prolongée		-	Autres diurétiques hypokaliémiants : Lasilix buv, Esidrex
<b>Fosamax 70mg</b>	Comprimé		-	Protelos 2g granulés pour susp buv en sachet
<b>Fosavance 70mg/2800 UI et 70mg/5600 UI</b>	Comprimé		PA irritant pour les muqueuses buccales et œsophagiennes	-
<b>Furadantine 50mg</b>	Gélule		Administrer immédiatement	-
<b>Gardenal 50 et 100mg</b>	Comprimé		-	-
<b>Glucophage 500mg, 850mg et 1000mg</b>	Comprimé pelliculé (sécable pour le 1000mg)		Administrer immédiatement	Glucophage poudre pour solution buvable à 500, à 850 et à 1000mg
<b>Gutron 2,5mg</b>	Comprimé		PA photosensible. Administration immédiate en mélange aqueux seulement	-
<b>Haldol 1 et 5mg</b>	Comprimé		-	Haldol 2mg/ml, sol buv en gouttes, fl. de 15ml
<b>Havlane 1mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Hemigoxine native 0,125mg</b>	Comprimé		Marge thérapeutique étroite, préférer la forme buvable	DIGOXINE 60ml 5µg/0,1ml solution buvable
<b>Heptamyl 187,8mg</b>	Comprimé		-	Heptamyl 30,5%, sol buv, fl. de 20ml (1 cp = 15 gouttes)
<b>Hydrea 500mg</b>	Gélule		<b>Produit cytotoxique.</b> Ne pas faire manipuler par femme enceinte se protéger avec gants et masque; adm. aussitôt après la mise en suspension	-

















<b>Hydrocortisone 10mg</b>	Comprimé sécable		Mélanger avec un aliment	-
<b>Hyperium 1mg</b>	Comprimé		Administrer immédiatement	-
<b>Ibuprofène 200mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Advil 20mg/ml, susp buv, fl. de 200ml
<b>Imodium 2mg</b>	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Imodium 20mg/100ml, sol buv, fl. de 90ml
<b>Imovane 3,75 et 7,5mg</b>	Comprimé enrobé sécable		PA photosensible, goût amer	-
<b>Imurel 50mg</b>	Comprimé pelliculé		-	-
<b>Inexium 20 et 40mg</b>	Comprimé gastro-résistant		Ne pas croquer. Possible de diluer le cp dans de l'eau ou de l'administrer par une SNG	Inexium granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet-dose. Ogastoro 15mg et 30mg, comprimés orodispersibles
<b>Isoptine 40mg</b>	Comprimé pelliculé			
<b>Isoptine 120mg</b>	Gélule		-	-
<b>Isoptine LP 240mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		-	Isoptine 40 mg ou 120 mg
<b>Ixprim 37,5mg/325mg</b>	Comprimé pelliculé		D'après RCP : les cps doivent être avalés tels quels, avec un liquide, sans être ni fractionnés, ni mâchés.	Ixprim 37,5mg/325mg comprimé effervescent
<b>Keppra 500mg</b>	Comprimé enrobé sécable		<u>Goût amer</u>	Keppra 100mg/ml, sol buv, fl. de 300ml
<b>Kredex 6,25mg, 12,5mg et 25mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Lamaline</b>	Gélule		-	Utilisation de la forme suppositoire







<b>Lamictal 25 et 50mg</b>	Comprimé dispersible ou à croquer		-	-
<b>Lamisil 250mg</b>	Comprimé sécable		Administration immédiate car photosensible	
<b>Laroxyl 25mg et 50mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Laroxyl 40mg/ml, sol buv, fl. de 60ml
<b>Lasilix 20mg et 40mg</b>	Comprimé (sécable pour le 40mg)		Administration immédiate car photosensible	Lasilix 10mg/ml, sol buv, fl. de 60ml
<b>Lasilix retard 60mg</b>	Gélule		Ne pas écraser le contenu	Lasilix 10mg/ml, sol buv, fl. de 60ml
<b>Lasilix spécial 500mg</b>	Comprimé sécable		Administration immédiate car photosensible	
<b>Lederfoline 5mg</b>	Comprimé sécable		A diluer dans l'eau	-
<b>Lercan 10 et 20mg</b>	comprimé pelliculé (sécable pour le 10mg)		-	-
<b>Lévothyrox 50µg, 100µg et 150µg</b>	Comprimé sécable		-	L-Thyroxine 150µg/ml, sol buv, fl. de 15ml
<b>Lexomil 6mg</b>	Comprimé quadrisécable		-	-
<b>Lioresal 10mg</b>	Comprimé sécable		PA photosensible	-
<b>Lipanthyl 145mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Lipanthyl 67mg, gélule micronisée
<b>Lipanthyl micronisé 67mg</b>	Gélule		Ne pas écraser le contenu	-
<b>Loxen 20mg</b>	Comprimé sécable		PA photosensible	-
<b>Loxen LP 50mg</b>	Gélule à libération prolongée		Ne pas écraser le contenu	-

<b>Lyrica 25mg, 50mg, 100mg et 300mg</b>	Gélule		-	-
<b>Lysanxia 10mg et 40mg</b>	Comprimé (sécable pour le 40 mg)		Comprimé qui se délite en bouche	Lysanxia 15mg/ml, sol buv en gouttes, fl. de 20ml
<b>Mag 2 100mg</b>	Comprimé		Non renseigné, préférer la poudre pour solution buvable	Poudre pour solution buvable en sachets
<b>Mantadix 100 mg</b>	Capsule molle		-	-
<b>Medrol 100mg</b>	Comprimé		A dissoudre dans eau	
<b>Medrol 4, 16 et 32mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Mestinon 60 mg</b>	Comprimé enrobé		-	-
<b>Meteospasmyl 300mg/60mg</b>	Capsule molle		-	-
<b>Mianserine 10 et 30mg</b>	Comprimé pelliculé		Ne pas croquer. Anesthésique au contact des muqueuses. Utiliser rapidement	-
<b>Minisintrom 1mg</b>	Comprimé		Pas d'étude de biodisponibilité. Avaler avec un verre d'eau.	-
<b>Modopar 125mg</b>	Comprimé dispersible		Dissoudre dans de l'eau. Administrer dans la 1/2 heure qui suit sa préparation (noircissement possible par oxydation).	-
<b>Modopar 62,5mg, 125mg et 250mg</b>	Gélule		D'après le RCP "le patient doit impérativement avaler la gélule entière, sans la croquer ou l'ouvrir."	Modopar 125mg, comprimé dispersible
<b>Modopar LP 125mg</b>	Gélule à libération prolongée		Aucune étude. Si ouverture, ne pas broyer le contenu	Modopar 125mg, comprimé dispersible
<b>Mono tildiem LP 200mg et 300mg</b>	Gélule à libération prolongée		A avaler rapidement. Ne pas broyer les microgranules gastrorésistants.	Autres inhibiteurs calciques : Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium

<b>Moscontin 10, 30, 60, 100 et 200mg</b>	Comprimé enrobé à libération prolongée		-	Skénan LP sans écraser les granules
<b>Neurontin 100mg, 300mg et 400mg</b>	Gélule		PA amer	-
<b>Noctamide 1mg et 2mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Nolvadex 10mg</b>	Comprimé pelliculé		Administration extemporanée, <b>protection nécessaire pour cytotoxiques, manipulation interdite chez la femme enceinte, protection de la lumière</b>	
<b>Noroxine 400mg</b>	Comprimé enrobé		Principe actif amer.	Autres quinolones 2G : Ciflox sol buv, Oflocet
<b>Norset 15mg</b>	Comprimé pelliculé			Norset 15mg/ml, sol buv, fl. de 66ml
<b>Novonorm 0,5mg, 1mg, 2mg</b>	Comprimé		Avaler avec de l'eau avant les repas.	
<b>Oflocet 200mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		Administration immédiate car sensible à la lumière et l'humidité	-
<b>Ogastoro 15mg et 30mg</b>	Comprimé orodispersible		Dissoudre dans un peu d'eau ou laisser fondre sous la langue. Attention peut boucher la SNG bien rincer la sonde après administration	-
<b>Omix LP 0,4mg</b>	Gélule avec microgranules gastrorésistantes		Administration extemporanée. Ne pas écraser les microgranules. Ne pas croquer les microgranules.	
<b>Oracilline 1 M UI</b>	Comprimé sécable			Oracilline 1MUI/10ml, susp buv, fl. de 180ml
<b>Orbenine 500mg</b>	Gélule		D'après le RCP "les gélules doivent être avalées sans les ouvrir, avec un verre d'eau".	
<b>Orelox 100mg</b>	Comprimé pelliculé		Photosensible. Goût désagréable	Forme pédiatrique : Orelox 8mg/ml, sol buv, fl. de 100ml
<b>Oroken 200mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Oroken 40mg/5ml et 100mg/5ml, poudre pr sol buv

<b>Oxeol 10mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Oxycontin LP 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 80mg</b>	Comprimé pelliculé		-	-
<b>Parkinane LP 2mg et 5mg</b>	Gélule		-	Artane 0.1mg/gtte, sol buv en gouttes, fl. de 30ml
<b>Parlodel 5 mg</b>	Gélule		-	
<b>Pentasa 500mg</b>	Comprimé		-	Pentasa 1g, susp rectale, fl. de 100ml ou Pentasa 1g granules sachet
<b>Perindopril 2, 4 et 8 mg</b>	Comprimé		-	-
<b>Permixon 160mg</b>	Gélule		-	-
<b>Plavix 75mg</b>	Comprimé pelliculé		A administrer à heure fixe, Principe actif sensible à la lumière	-
<b>Polaramine 2mg</b>	Comprimé sécable		-	Polaramine sirop 0,5mg/ml
<b>Pradaxa 75 et 110mg</b>	Gélule		Non renseigné	-
<b>Praxilene 200 mg</b>	Comprimé pelliculé		Irritant pour l'œsophage	-
<b>Previscan 20mg</b>	Comprimé quadrisécable		Changement de couleur mais aucune modification sur l'efficacité	-
<b>Primperan 10mg</b>	Comprimé sécable		-	Primperan sol buvable (0,1%, sol buv, fl. de 200ml) ou suppositoire
<b>Pyostacine 500mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		PA amer	-
<b>Reminyl LP 8mg et 16mg</b>	Gélule		-	Reminyl 4mg/ml, sol buv, fl. de 100ml

<b>Requip 2mg et 5mg</b>	Comprimé pelliculé		Administration immédiate	-
<b>Requip LP 2mg et 4mg</b>	Comprimé pelliculé à libération prolongée		-	Requip 2mg et 5mg comprimé
<b>Rifadine 300mg</b>	Gélule		-	Rifadine 2%, susp buv, fl. de 120ml
<b>Rifater 120mg/50mg/300mg</b>	Comprimé enrobé		En théorie possibilité	-
<b>Rilutek 50mg</b>	Comprimé pelliculé		Aucune donnée	-
<b>Risperdaloro 0,5mg ; 1 et 2 mg</b>	Comprimé orodispersible		Laisser fondre le comprimé sur la langue	Risperdal 1mg/ml, sol buv, fl. de 60ml
<b>Rivotril 2mg</b>	Comprimé sécable		-	Rivotril 2,5mg/ml, sol buv, fl. de 20ml
<b>Sectral 200mg et 400mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Sectral 40mg/ml, sol buv, fl. de 125ml
<b>Sectral LP 500mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Sectral 40mg/ml, sol buv, fl. de 125ml
<b>Seresta 10mg et 50mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Seroplex 10mg et 20mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		-	Seropram 40 mg/mL, sol buv, fl. de 12 mL à Attention à la posologie
<b>Seropram 20mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		-	Seropram 40mg/ml, sol buv, fl. de 12ml
<b>Simvastatine 20mg et 40mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Autres statines : Tahor, Pravastatine
<b>Sinemet 100mg/10mg et 250mg/25mg</b>	Comprimé sécable		Administration immédiate	-
<b>Sinemet LP 100mg/25mg et 200mg/50mg</b>	Comprimé à libération prolongée		-	Modopar cp dispersible

<b>Sintrom 4mg</b>	Comprimé sécable		Possible d'un point de vu galénique mais attention à la marge thérapeutique	-
<b>Skenan LP 10mg, 30mg, 60mg et 100mg</b>	Gélule		-	-
<b>Sophidone LP 4mg, 8mg, 16mg et 24mg</b>	Gélule		Ne pas écraser le contenu	-
<b>Spasfon Iyoc 80mg</b>	Lyophilisat oral		A dissoudre dans l'eau ou à faire fondre sous la langue	-
<b>Speciafoldine 0,4mg et 5mg</b>	Comprimé		-	-
<b>Stablon 12,5 mg</b>	Comprimé enrobé		-	-
<b>Stagid 700mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Stalevo 50, 100 et 150mg</b>	Comprimé pelliculé		-	-
<b>Stilnox 10mg</b>	Comprimé sécable		Administration immédiate car photooxydation	-
<b>Sulfarlem s25 25mg</b>	Comprimé enrobé		-	-
<b>Tahor 10mg, 40mg, 80mg</b>	Comprimé pelliculé		-	-
<b>Tanakan 40mg</b>	Comprimé enrobé		-	Tanakan 40mg/ml solution buvable
<b>Tardyferon 80mg</b>	Comprimé enrobé		-	-
<b>Tareg 40mg, 80mg et 160mg</b>	Comprimé pelliculé		Sécable mais goût amer et non soluble	-
<b>Tavanic 500mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		Administration immédiate	-

<b>Tegretol LP 200 mg, 400mg</b>	Comprimé pelliculé sécable à libération prolongée		-	Tegretol 200mg
<b>Temerit 5mg</b>	Comprimé quadrisécable		-	-
<b>Temesta 1mg et 2,5mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Tenormine 50mg et 100mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		-	-
<b>Tercian 25 et 100mg</b>	Comprimé pelliculé sécable		-	Tercian 40mg/ml, sol buv, fl. de 30ml
<b>Tiapridal 100mg</b>	Comprimé sécable		Possible mais préférer la forme buvable	Tiapridal 5mg/goutte, solu buv en goutte, fl. de 30ml
<b>Tildiem 60mg</b>	Comprimé		-	Autres inhibiteurs calciques : Isoptine, Amlodipine, Loxen, Nifédipine sol buv, Unicordium
<b>Tiorfan 100mg</b>	Gélule		Goût désagréable	-
<b>Topalgic 50mg</b>	Gélule		Dilution dans un yaourt	Topalgic 100mg/ml, sol buv, fl. de 10ml ou utilisation de Tramadol 50mg cpr effervescent
<b>Topalgic LP 100mg, 150mg et 200mg</b>	Comprimé à libération prolongée		-	Topalgic 100mg/ml, sol buv, fl. de 10ml
<b>Tranxene 5mg, 10mg et 20mg</b>	Gélule		Photosensible	Préférer Lysanxia sol buvable
<b>Triatec 1.25, 2.5, 5 et 10mg</b>	comprimé		D'après le RCP "Triatec doit être avalé avec du liquide. Il ne doit être ni mâché, ni écrasé".	Autres IEC : Enalapril, Coversyl, Cibacène, Lisinopril
<b>Triflucan 50mg et 200 mg</b>	Gélule		-	TRIFLUCAN forme buvable 50mg/5ml ou 200mg/5ml, flacon de 35ml
<b>Trivastal 20mg</b>	Comprimé enrobé		D'après RCP "les comprimés sont à avaler avec un demi-verre d'eau, sans les croquer, en fin de repas".	-



<b>Trivastal LP 50mg</b>	Comprimé enrobé		-	Trivastal 20mg ou Fonzylane comprimé
<b>Urbanyl 5 mg</b>	Gélule		-	
<b>Valium 2mg, 5mg et 10mg</b>	Comprimé sécable		-	Valium 1%, sol buv en gouttes, fl. de 20ml
<b>Vastarel LP 35mg</b>	Comprimé pelliculé		-	Vastarel 20mg/ml, sol buv, fl. de 60ml
<b>Vitamine B1 B6</b>	Comprimé pelliculé		Amertume et odeur désagréable	-
<b>Vitamine B12 250µg</b>	Comprimé sécable		Pas d'étude sur les comprimés écrasés. PA photosensible	Vitamine B12 1mg/2ml, sol buv, amp. de 1 et 2ml
<b>Vogalène 15mg</b>	Gélule		D'après RCP "ne pas les ouvrir"	Vogalène 0,1%, sol buv, fl. de 150ml
<b>Vogalene lyoc 7,5mg</b>	Lyophilisat oral		Dispersible dans l'eau et dans la bouche. Ne pas croquer.	-
<b>Xanax 0,25mg et 0,50mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Xatral 2,5mg</b>	Comprimé pelliculé		A priori possible mais PA photosensible et amer	-
<b>Xatral LP 10mg</b>	Comprimé à libération prolongée		-	Xatral 2,5 mg
<b>Zelitrex 500mg</b>	Comprimé enrobé		Non renseigné	Zovirax sol buvable
<b>Zestril 20mg</b>	Comprimé sécable		-	-
<b>Zithromax 250mg</b>	Comprimé pelliculé		PA photosensible	Zithromax 40mg/ml, poudre pour susp buv, fl. de 30ml
<b>Zocor 5, 20 et 40mg</b>	Comprimé enrobé (sécable pour le 20mg)		-	Autre Statine: Elisor comp, Tahor 10 mg ou 40 mg etc...

<b>Zophren 4mg et 8mg</b>	Lyophilisat oral		-	Zophren 4 mg/5 mL, sirop, fl. de 50 ml
<b>Zovirax 200 et 800 mg</b>	Comprimé		-	Solution buvable
<b>Zyprexa 5mg</b>	Comprimé enrobé		-	Zyprexa velotab 5mg et 10mg, comprimés orodispersibles